

# Biopsi (vævsprøve)

med Tru-Cut kanyler fra lever,  
nyrer eller lymfeknuder i maveregionen

Vævsprøver fra lever, nyrer og lymfeknuder i mave-regionen foregår ultralydsvejledt med en 2 mm tyk specialkanyle (Tru-Cut), og anvendes til at undersøge organets struktur nærmere i et mikroskop, for at stille en mere præcis diagnose.

## Forberedelse

### Faste

For at få et tydeligt billede over organerne ved ultralydsscanningen, skal du være fastende i 4 timer inden undersøgelsen. Dvs. at du ikke må spise eller drikke. Du må dog drikke et enkelt glas vand.

### Pause med medicin

Tager du medicin med blodfortyndende virkning, skal du holde pause med dette i 3 dage inden vævsprøven. Du skal påbegynde medicinen igen 4 timer efter, at vævsprøven er taget.

Er du i behandling med blodfortyndende medicin som fx Marevan og /eller Plavix, skal du oplyse det allerede ved booking af tid til vævsprøven.

### Inden undersøgelsen

Der skal altid foreligge en blodprøve med koagulationstal (INR), før vævsprøven kan tages. Blodprøven må ikke være mere end 2 dage gammel. Du kan få taget blodprøven hos din egen læge / andet hospital og evt. medbringe blodprøveresultatet. Hvis ikke, tager vi blodprøven (INR), når du ankommer.

Du skal møde på sengeafdelingen 1 time før tidspunktet for vævsprøven og medbringe evt. blodprøveresultater fra egen læge eller andre hospitaler.

Hvis blodprøven viser, at det ikke er forsvarligt at tage vævsprøven, må vi udsætte eller aflyse at tage vævsprøven.

## Undersøgelsen

Ultralydsundersøgelsen og vævsprøven tager kun få minutter.

Ultralydsbilledet viser, hvor det er bedst og mest sikkert at tage vævsprøven.

Du ligger på ryggen til undersøgelsen og får lokalbedøvelse i huden, hvor prøven skal tages.

Både før og efter undersøgelsen holder vi øje med dit blodtryk og puls.

Du får plaster på, hvor vævsprøven er taget. Det kan du tage af efter 24 timer.

## Efter undersøgelsen

### Observation

Du skal blive hos os til observation, hvor du skal være sengeliggende i mindst 4 timer efter at have fået taget vævsprøve – heraf de første par timer liggende på højre side.

### Faste

De første 2 timer efter undersøgelsen skal du fortsat være fastende. De sidste 2 timer må du drikke vand, men ikke spise. Derefter kan du frit spise, drikke og forlade hospitalet.

### De første dage

Du bør afstå fra større fysisk aktivitet de første dage efter undersøgelsen, herunder sport og rengøring. Det er for at nedsætte risiko for blødning, hvor vævsprøven er taget

### Svar på vævsprøven

Vævsprøven bliver sendt til nærmere undersøgelse under mikroskop. Denne procedure kan tage ca. 5 hverdage. Svaret bliver sendt til den læge, som har henvist dig, og du aftaler nærmere plan / behandling med denne læge.

### Er der ubehag – og hvad så?

Der kan være ømhed efter, at der er taget en vævsprøve, men de fleste får ingen gener.

NB! Ved tiltagende smerte, feber eller svimmelhed skal du kontakte os.

## Aleris Hospitaler - Vest

---

### Aalborg

Sofiendalsvej 97  
DK - 9200 Aalborg SV  
Tlf. +45 3637 2750  
aalborg@aleris.dk

### Esbjerg

Bavnehøjvej 2  
DK - 6700 Esbjerg  
Tlf. +45 3637 2700  
esbjerg@aleris.dk

### Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal  
DK - 8200 Aarhus N  
Tlf. +45 3637 2500  
aarhus@aleris.dk

### Herning

Poulsgade 8, 2. sal  
DK - 7400 Herning  
Tlf. +45 3637 2600  
herning@aleris.dk

## Aleris Hospitaler - Øst

---

### København

Gyngemose Parkvej 66  
DK - 2860 Søborg  
Tlf. +45 3817 0700  
kobenhavn@aleris.dk

### Ringsted

Haslevvej 13  
DK - 4100 Ringsted  
Tlf. +45 5761 0914  
ringsted@aleris.dk

[www.aleris.dk](http://www.aleris.dk)

KTJJ00  
KTPJ05  
KTKA00